

今年はアメシロ大丈夫？

アメリカシロヒトリの発生する時期になりました。

アメリカシロヒトリって？

白い小型の蛾で、クルミ、カキ、サクラ、ウメ、ハナミズキなどの落葉樹に好んで産卵します。幼虫は集団で枝先に白い糸でテント状の巣をつくり、ふ化後10日から12日は巣の中でかたまって生活していますが、その後分散して庭木、花木、果樹、街路樹等各種樹木の葉を食い荒らします。

駆除はどうするの？

- 1 庭木をチェックしましょう。枝先に白い網状の巣がついていませんか。巣の中の幼虫は葉の葉脈だけ残して食害するので葉が透けて見えます。巣のついた枝葉を切り取りとって焼くか踏みつぶしてください。




アメシロの巣
(この段階での駆除が一番効果的です)

- 2 発見が遅れて巣から分散してしまったら、薬剤散布してください。なお、植物の種類により、使用薬剤が異なりますので、詳細は農薬販売店に相談しましょう。

また、薬剤散布前には、飛散による洗濯物等への影響がある場合がありますので、ご近所同士の声掛け等にもご配慮ください。

- 3 個人での対応が困難な場合は、害虫駆除業者または造園業者等へ依頼すれば消毒、枝払い等をしてくれますが、有料となります。

害虫の防除、駆除は樹木の所有者の責任です。発見が遅れると近隣の方への迷惑にもなります。ご近所同士で声をかけあい、早期発見、早期防除に努め、まちの緑をみんなで守りましょう。



発信元：塩尻市
吉田地区