

1. アゲハモドキ(アゲハモドキガ科)

ジャコウアゲハ・クロアゲハに似ているガで、ベイツ型擬態と考えられています。北海道～九州に分布し、食草はミズキ科のミズキ・ヤマボウシなどです。



幼虫

2. ナチキシタドクガ(ドクガ科)

富山・千葉以南の暖地に分布し、食草はコナラ・ミズキですが、温暖化の影響などで塩尻市内でも見かけることがあります。



3. ツキワクチバ(ヤガ科)

石川・千葉以南の分布とされ暖地のガで、食草はアラカシです。



4. ベニシタバ(ヤガ科)

北海道～九州の分布で、前翅は樹皮の模様に似ていて、後翅は紅色で美しい。食草はヤナギ科のイヌコリヤナギ・ポプラなどです。



5. エゾベニシタバ(ヤガ科)

ベニシタバに似ているが、後翅が橙色。北海道～本州の分布で、食草はヤナギ科のドロノキ・ポプラです。



6. オニベニシタバ(ヤガ科)

ベニシタバに似ているが、後翅が橙色。北海道～九州の分布で、食草はブナ科コナラ属のミズナラ・クヌギなどです。



7. ムラサキシタバ(ヤガ科)

翅幅が 10cm ほどの大型のがで、北海道～四国に分布する。食草はヤナギ科のヤマナラシ・ポプラなどです。



8. シロシタバ(ヤガ科)

前翅は岩肌の模様で、後翅は白地に 2 本の黒線があります。北海道～九州に分布するやや大型のがで、食草はバラ科のウワミズザクラ・イヌザクラ・リンゴです。



9. コシロシタバ(ヤガ科)

富山・千葉以南の暖地に分布し、食草はクヌギです。



10. ヒメシロシタバ(ヤガ科)

北海道～九州に分布し、食草はカシワです。

